

# Peripheral IV catheter instruction

## Insertion and dressing



สงขลานครินทร์

A



Scrub with friction คือ ใช้สำลีชุบน้ำยา 2% chlorhexidine in 70% alcohol ขัดตำแหน่งแทงเข็ม เป็นวงกว้างเท่ากับวัสดุปิดแผล เปลี่ยนสำลีที่ขัดจนกว่าสำลีนั้นไม่มีสีขี้โคล

B



ต่อชุดให้สารน้ำ/ชุด lock ระบบ

C



ปิดแผลไม่ให้มีฟองอากาศ

D



ยึดตำแหน่งด้วยเทปทางการแพทย์

E



ยึดตำแหน่งด้วยเทปทางการแพทย์

G



เก็บปลายสายของชุดให้สารน้ำด้วยเทคนิคโอเมก้า

H



ระบุวันที่แทงเข็ม

### Reference

- INS 2016 Infusion Nursing Standards of Practice. Journal of Infusion Nursing 2016



# Peripheral IV catheter Flushing and Locking



## Flushing

A




เทคนิค push - pause (push 1 ซีซี แล้วหยุด 2 วินาที ทำซ้ำ เหลือไว้ 0.5 ซีซี แล้ว clamp ระบบทันที)



B



## Locking



กรณีให้ยาที่ทำปฏิกิริยากับ NSS แนะนำให้ flush ด้วย 5%D/W ก่อนและหลังให้ยาชนิดนั้น  
กรณีดูดเลือดส่งตรวจให้ดูด NSS/heparin ที่ locking ที่ัง