

ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แบบฟอร์ม tracer severe sepsis/septic shock

สัญญาณชีพเมื่อ พ.สั่ง Order/Dx. หรือ พ.order lab c/s หรือ พ.เปลี่ยนยาฆ่าเชื้อ มี Sign SIRS + R/O infection
 เมื่อ พ.สั่ง Order/Dx. หรือ พ.order lab c/s หรือ พ.เปลี่ยนยาฆ่าเชื้อ หรือมี Sign SIRS + R/O infection

... สัญญาณชีพเมื่อ พ.สั่ง Order/Dx. หรือ พ.order lab c/s หรือ พ.เปลี่ยนยาฆ่าเชื้อ มี Sign SIRS + R/O infection
  หอบผู้ป่วย

... e DX. Severe sepsis/septic shock

BP.....mmHg MAP.....mmHg HR.....bpm RR..... bpm RR.....bpm

**Clinical Data Severe sepsis/septic shock**

R/O infection.....

SIRS	Organ failure
..... Temp < 36 / > 38 °C	.....Lactate >2
..... HR > 90 bpm	.....Urine <0.5ml/kg/hr
..... Tachypnea	.....ALI PF<250 -pneumonia
..... leukocytosis < 4000/> 12000	.....ALI PF<200+pneumonia
.....bandemia >10%	.....Cr.>2.0
	.....Bili > 2
	.....Plt < 100,000
	PT>1.5

หายใจเร็ว / หอบ

มี sign SIRS + organ failure อย่างน้อย 1 รายการ ถือว่า มี severe sepsis

เวลาที่เริ่ม load IV
 สั่ง IV load ครั้งที่ CC

เวลาที่หยุด load IV/ ฃปรับ IV ไม่ได้แล้ว หรือ BP ดีแล้ว
 ชนิดของ IV ที่ load

Resuscitation at time.....type of fluid..... --> ..CC
 IV load ที่ load ทั้งหมด ที่ CC

Resuscitation at time.....total volume .....CC

Start vasoactive agent at time..... levonhed / dopamine / adrenaline

เวลาที่เริ่มให้ยา (ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้)

BP.....mmHg MAP.....mmHg HR.....bpm RR..... bpm RR.....b

Antibiotic time .....Drug .....
 ชื่อยา

Send to ICU at time .....
 เวลาที่พยาบาลให้ยาแก่ผู้ป่วย

สัญญาณชีพ หลังให้ยา

สู้พัตรา อุปนิสากร/ อ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวณิช 1 มีนาคม 2559

ถ้าไม่มีเตียง ICU บันทึกไว้ เพื่อนำมาประสานงานเรื่องเตียง