

แบบทดสอบ

1. ข้อใดจัดเป็น ADR type A
 - A. น้องมาร์วินกิน ibuprofen แล้วตาบวม
 - B. ป้าชูศรีกินยา amlodipine แล้วขาบวม
 - C. พี่มาลีกิน allopurinol แล้วเกิดผื่น MP rash
 - D. ลุงวิชัยกิน dimenhydrinate แล้วเกิดผื่น fixed drug eruption
2. ข้อใดจัดเป็น ADR type B
 - A. บ้าใจกิน simvastatin แล้วปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 - B. ลุงมนตรีกินยาต้านวัณโรคแล้วคลื่นไส้อาเจียน
 - C. น้องสมศรีกิน HCTZ แล้วเกิดผื่นแดงบริเวณแขนขา เฉพาะนอกร่มผ้า
 - D. พี่แดงกิน co-trimoxazole แล้วเกิด serum sickness
3. ข้อใดจัดเป็น ADR type A
 - A. น้องเยาว์กิน tramadol แล้วคลื่นไส้อาเจียน
 - B. ลุงชาติกิน Enalapril แล้วไอ
 - C. ในระหว่างนอนโรงพยาบาลลุงชัยได้รับ colistin แล้วเกิด AKI
 - D. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดจัดเป็นอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ
 - A. มีประวัติแพ้ cloxacillin เป็นผื่น ได้รับ dicloxacillin แล้วเกิดผื่น
 - B. มีประวัติแพ้ ibuprofen ตาบวม ได้รับ naproxen เกิด anaphylaxis
 - C. มีประวัติแพ้ ponstan[®] เป็น angioedema ได้รับ mefenamic acid แล้วตาบวม
 - D. มีประวัติแพ้ phenytoin เป็น MP rash ได้รับ carbamazepine แล้วเกิด SJS
5. ข้อใดจัดเป็น preventable ADR
 - A. ผู้ป่วยเกิดผื่นแดงบริเวณใบหน้า หน้าอก หลังได้รับ vancomycin 2 gm drip in 1 hr. ในโดสแรก
 - B. ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ amoxicillin เป็นผื่นลมพิษ ได้รับ co-amoxiclav แล้วเกิด anaphylaxis
 - C. ผู้ป่วยเกิด hypotension หลังได้รับ levofloxacin 750 mg drip in 1 hr. ในโดสแรก
 - D. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดถูกต้อง

- A. ผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรอง HLA-B*15:02 ผลเป็น positive ระบบ HIS จะ lock การสั่งยา carbamazepine และ oxcarbazepine
- B. ผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรอง HLA-B*15:02 ผลเป็น positive ระบบ HIS จะ lock การสั่งยา phenytoin
- C. ผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรอง HLA-B*57:01 ผลเป็น positive ระบบ HIS จะ lock การสั่งยา allopurinol
- D. ผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรอง HLA-B*58:01 ผลเป็น positive ระบบ HIS จะ lock การสั่งยา febuxostat

7. ข้อใดไม่ใช่ยาในโครงการ ACCP SCARs preventing project ของฝ่ายเภสัชกรรม รพ.สงขลา นครินทร์

- A. Allopurinol
- B. Carbamazepine
- C. Clarithromycin
- D. Phenytoin

8. ข้อใดผิด

- A. Vitamin K inj. สามารถให้โดย IV push ได้
- B. Vancomycin 2 g. IV infusion over 4 hrs.
- C. Levofloxacin 500 mg IV infusion over 60 mins
- D. Levofloxacin 750 mg IV infusion over 90 mins

9. ยาใดพบรายงานการเกิด drug induced renal disorders

- A. Amphotericin B
- B. Colistin
- C. Tenofovir
- D. ถูกทุกข้อ

10. ยาใดพบรายงานการเกิด drug induced liver injury

- A. Pyrazinamide
- B. Rifampicin
- C. Phenytoin
- D. ถูกทุกข้อ