



ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แบบประเมินคุณภาพ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง (แก้ไข 1)

วัตถุประสงค์ 1. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะติดเชื้อและหลอดเลือดดำส่วนกลางอักเสบ

เกณฑ์การประเมินผล ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ.....

ข้อ	กิจกรรม	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยา hibiscrub หรือดูมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังการพยาบาลที่ต้องสัมผัสสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง เช่น การทำแผล การเปลี่ยนขวดสารละลาย การเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ให้สารละลาย การฉีดยา เป็นต้น			
2	ดูแลสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางให้เป็นระบบปิดอยู่เสมอหรือยึดหลัก sterile technique อย่างเคร่งครัดเมื่อจำเป็นต้อง manipulate สายสวน			
3	หลีกเลี่ยงการดูดเลือดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง			
4	ประเมินแผลตำแหน่งที่แทงสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง			
5	หากมีกรณี ดังต่อไปนี้ให้ประเมินข้อ 5.1-5.4 <ul style="list-style-type: none"> - แผลเปื้อน มีเลือดซึม หรือวัสดุปิดแผลหลุดลอก - แผลที่ปิดด้วย tegaderm ครบ 7 วัน - แผลที่ปิดด้วยผ้าก๊อชปลอดเชื้อครบ 2 วัน (ทำวันเว้นวัน) 			
	5.1 ทำแผลใหม่ทันทีที่แผลเปื้อน มีเลือดซึม หรือวัสดุปิดแผลหลุดลอก			
	5.2 ใช้น้ำยา 2% chlorhexidine in 70% alcohol ทำความสะอาดแผล			
	5.3 กรณีแผลเปียกชุ่ม ใช้ผ้าก๊อชปิดแผล			
	5.4 กรณีแผลแห้ง ใช้ tegaderm ปิดแผล			
6	ตรวจสอบระยะเวลาในการเปลี่ยนขวดสารละลายและเปลี่ยนสารละลายขวดใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด (สารละลายทั่วไปแขวนไว้ได้ไม่เกินภายใน 24 ชั่วโมง)			
7	ตรวจสอบระยะเวลาในการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ให้สารละลาย และเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ให้สารละลายทุก 4 วัน รวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์และข้อต่อต่างๆที่ใช้ร่วมกับการให้สารละลาย โดยยึดเทคนิคปราศจากเชื้ออย่างเคร่งครัด และระบุวันหมดอายุที่			
8	ตรวจสอบระยะเวลาในการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ให้ TPN และเปลี่ยนทุก 24 ชั่วโมง			
9	เตรียมยาสำหรับฉีดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางโดยไม่มีการปนเปื้อน			
10	ประเมินอาการ ปวด บวม แดง ของผิวหนังบริเวณที่คาสายสวนหลอดเลือดดำ			

วันที่เก็บข้อมูล.....

หมายเหตุ : เก็บข้อมูลด้วยการสอบถาม / สังเกต

หอผู้ป่วย.....