



ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
แบบประเมินคุณภาพ : ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา โดยใช้ Medication nebulizer

- วัตถุประสงค์
1. ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยใช้ Medication nebulizer อย่างถูกต้อง
  2. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
- เกณฑ์การประเมิน
- ข้อ \* ต้องผ่านการประเมิน ร้อยละ 100 %  
ข้ออื่น ๆ ต้องผ่านการประเมิน  $\geq 80$  %

ที่	เกณฑ์เชิงกระบวนการ	ใช่	ไม่ใช่	วิธีประเมิน
<b>การพ่นยา</b>				
1.*	ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือ 70% Alcohol			สังเกต
2.*	เตรียมยาใส่ Medication nebulizer อย่าง Aseptic Technigue			สังเกต
3.	ประเมินการหายใจและ/หรือฟังเสียงปอด พร้อมลงบันทึก			สังเกต
4.*	กระตุ้นให้ผู้ป่วยไอหรือดูดเสมหะ			สังเกต
5.	เช็ดข้อต่อของอุปกรณ์พ่นยาและ Mask ด้วย 70% Alcohol			สังเกต
<b>ขณะพ่นยา</b>				
6.*	จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั่งหรือศีรษะสูง ในกรณีไม่มีข้อห้าม			สังเกต
7.*	เปิด Flow meter ของ O <sub>2</sub> หรือ Air อัตราการไหล 5-8 ลิตรต่อนาที			สังเกต
8.*	กระเปาะของชุด Medication nebulizer ตั้งจากตลอดเวลา			สังเกต/ตรวจสอบ
9.*	Medication nebulizer มีการพ่นฝอยละเอียด			สังเกต/ตรวจสอบ
10.	ปิด O <sub>2</sub> หรือ Air เมื่อยาหมด			สังเกต/ตรวจสอบ
<b>หลังพ่นยา</b>				
11.	เช็ดอุปกรณ์พ่นยาด้วย 70% Alcohol			สังเกต/ตรวจสอบ
12.	เก็บอุปกรณ์พ่นยาและ Mask ใส่ถุง Sterile ปิดปากถุงให้เรียบร้อย			สังเกต/ตรวจสอบ
13.	เปลี่ยนอุปกรณ์พ่นยาทุก 24 ชม. และเขียนวันเริ่มใช้			สังเกต/ตรวจสอบ

ผู้เก็บข้อมูล .....

วันที่ .....

หอผู้ป่วย .....