



ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบประเมินคุณภาพ : การสวนปัสสาวะ

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนปัสสาวะ

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100

ที่	กิจกรรม	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	วิธีประเมิน
1.	ล้างมือด้วย Antiseptic ได้แก่ Alcohol สำหรับล้างมือหรือ Hibiscrub ก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ			สังเกต
2.	ใส่ถุงมือโดยไม่ให้มีการ Contamination			สังเกต
3.	ใส่สายสวนปัสสาวะด้วย Sterile technique โดย 3.1 ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนการสวน <input type="checkbox"/> ผู้หญิง : ใช้ Forceps คีบสำลิจูบ Povidone iodine เช็ด Mons Pubis, labia majora (ซ้าย-ขวา) Labia minora (ซ้าย-ขวา) จากบนลงล่าง อย่างละ 1 ครั้ง และเช็ด Meatus 2 ครั้ง (ใช้สำลิจัดครั้งเดียวทิ้ง) <input type="checkbox"/> ผู้ชาย : ใช้ผ้าก๊อศหุ้มส่วนโคน Penis จับตั้งขึ้น ร่นหนังหุ้มปลายลงให้หมด ใช้ Forceps คีบสำลิจูบ Povidone iodine เช็ดรอบ ๆ รูเปิดปัสสาวะ โดยเช็ดวนออกไปเป็นวงกลมให้ทั่วปลาย Penis (ห้ามเช็ดย้อน) 3.2 พูผ้าเจาะกลาง 3.3 มือที่จับสายสวนปัสสาวะ ไม่ควรสัมผัสกับสิ่งอื่น 3.4 Sterile water ที่ใส่ใน Balloon ไม่ Contaminate			สังเกต
4.	ใช้ Single-use Lubricant jelly ในการสวนปัสสาวะ (ใช้ 1 หลอด ต่อ 1 คน ใช้ภายใน 24 ชม)			สังเกต
5.	กรณีคาสายสวน ยึดสายสวนปัสสาวะด้วยพลาสติกโดย <input type="checkbox"/> ผู้หญิง : ติดไว้ที่หน้าขา <input type="checkbox"/> ผู้ชาย : ติดที่หน้าท้องน้อยเฉียงไปทางขาหนีบ			สังเกต
6.	ดูแลให้สายสวนปัสสาวะกับถุงเก็บปัสสาวะอยู่ในระบบปิดและคงไว้ ซึ่งการปราศจากเชื้อตลอดเวลา โดย <input type="checkbox"/> แขนงถุงให้ต่ำกว่าผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยลุกนั่ง เดิน ถุงต่ำกว่าระดับเอว <input type="checkbox"/> ไม่วางถุงปัสสาวะบนเตียงผู้ป่วยหรือที่พื้น			สังเกต
7.	มีการบันทึกชื่อผู้สวนปัสสาวะไว้ใน Kardex			สัมภาษณ์/ตรวจบันทึก

ผู้เก็บข้อมูล

วันที่ เก็บข้อมูล

.....

.....

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 มค.2555

ประเมินการสวนปัสสาวะ/คุณวรารณ /Desktop /วรรณิตา (สุภาพร)