



ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sticker ผป.

แบบประเมินคุณภาพ : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ

วัตถุประสงค์

ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

เกณฑ์เชิงกระบวนการ ต้องผ่านการประเมิน 100%

ที่	เกณฑ์เชิงกระบวนการ	ปฏิบัติ/ใช่	ไม่ปฏิบัติ/ไม่ใช่	ไม่มีกิจกรรม	วิธีประเมิน
1	ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการสัมผัสสายสวนปัสสาวะ				สังเกต/สัมภาษณ์
2.	ดูแลสายสวนให้อยู่ในระบบปิดตลอดเวลา				สังเกต
3	ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง				สังเกต/สัมภาษณ์
4	ยึดสายสวนปัสสาวะด้วยพลาสติกที่บริเวณขาในผู้หญิงและบริเวณท้องน้อยเฉียงไปทางขาหนีบในผู้ชาย				สังเกต
5	แขวนถุงปัสสาวะต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะและสูงเหนือพื้นประมาณ 10 ซม.				สังเกต
6	ดูแลสายสวนไม่ให้หัก พับ งอ				สังเกต
7	เปลี่ยนสายสวนเมื่อสายตัน หรือมีตะกอน				สังเกต/สัมภาษณ์
8	กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 8.1 ผู้ป่วยใช้ urine bag มีการ clamp สายสวนปัสสาวะทุกครั้ง 8.2 ผู้ป่วยใช้ urinovolumeter มีการ clamp สายสวนปัสสาวะด้วยตัวหนีบ urinovolumeter				สังเกต/สัมภาษณ์
9.	เทปัสสาวะทิ้ง เมื่อมีปัสสาวะเกิน 2/3 ของถุง				สังเกต
10.	สวมถุงมือสะอาดและล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือ ที่ผสม Alcohol ทุกครั้งก่อนและหลังเทปัสสาวะ				สังเกต/สัมภาษณ์
11	ขณะเทปัสสาวะ ไม่ให้ท่อเปิด urine bag สัมผัสกับขวดหรืออุปกรณ์ที่ใช้ดวงปัสสาวะ				สังเกต/สัมภาษณ์
12	แยกภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้เทปัสสาวะของผู้ป่วยแต่ละราย				สังเกต/สัมภาษณ์
13	ใช้ urinovolumeter ทุกครั้งที่บันทึกปริมาณปัสสาวะทุก 1 ชั่วโมง				สังเกต/สัมภาษณ์
14	มีการ Reminder การคาสายสวนปัสสาวะเมื่อครบ 3 วัน				สังเกต/สัมภาษณ์

ผู้เก็บข้อมูล..... วันที่เก็บข้อมูล.....



ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sticker ผป.

แบบประเมินคุณภาพ : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ

วัตถุประสงค์

ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

เกณฑ์เชิงกระบวนการ ต้องผ่านการประเมิน 100%

ที่	เกณฑ์เชิงกระบวนการ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	วิธีประเมิน
1	ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการสัมผัสสายสวนปัสสาวะ			สังเกต/สัมภาษณ์
2.	ดูแลสายสวนให้อยู่ในระบบปิดตลอดเวลา(ปลายท่อถุงปัสสาวะไม่เปิดทิ้งไว้)			สังเกต
3	ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง			สังเกต/สัมภาษณ์
4	ยึดสายสวนปัสสาวะด้วยพลาสติกที่บริเวณขาในผู้หญิงและบริเวณท้องน้อยในผู้ชาย			สังเกต
5	แขวนถุงปัสสาวะต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะและสูงเหนือพื้นประมาณ 10 ซม.			สังเกต
6	ดูแลสายสวนไม่ให้หัก พับ งอ			สังเกต
7	เปลี่ยนสายสวนเมื่อสายตัน หรือมีตะกอน			สังเกต/สัมภาษณ์
8	กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หากใช้ urine bag มีการ clamp สายสวนปัสสาวะทุกครั้ง หรือใช้ urinovolumeter มีการ clamp สายสวนปัสสาวะด้วยตัวหนีบ urinovolumeter			สังเกต/สัมภาษณ์
9.	เทปัสสาวะทิ้ง เมื่อมีปัสสาวะเกิน 2/3 ของถุง			สังเกต
10	สวมถุงมือสะอาดและล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือ ที่ผสม Alcohol ทุกครั้งก่อนและหลังเทปัสสาวะ			สังเกต/สัมภาษณ์
12	ขณะเทปัสสาวะ ไม่ให้ท่อเปิด urine bag สัมผัสกับขวดหรืออุปกรณ์ที่ใช้ดวงปัสสาวะ			สังเกต/สัมภาษณ์
13	แยกภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้เทปัสสาวะของผู้ป่วยแต่ละราย			สังเกต/สัมภาษณ์
14	ใช้ urinovolumeter ทุกครั้งที่บันทึกปริมาณปัสสาวะทุก 1 ชั่วโมง			สังเกต/สัมภาษณ์
15	มีการ Reminder การคาสายสวนปัสสาวะเมื่อครบ 3 วัน			สังเกต/สัมภาษณ์

ผู้เก็บข้อมูล..... วันที่เก็บข้อมูล.....