

## รายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ขั้นตอนการรายงานเป็นไปในทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบข้อเท็จจริง ซึ่งสามารถนำไปวางแผนมาตรการแก้ไข และป้องกันการเกิดเหตุขึ้น
- เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

### ขอบเขตการรายงาน

- เหตุการณ์ หรือสิ่งผิดปกติ
- เจ้าหน้าที่ทุกคนในฝ่ายบริการพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์/ผู้พบเห็นเหตุการณ์/ผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ หรือผู้รับทราบเหตุการณ์

### อุบัติการณ์/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่ต้องรายงาน

- เครื่องมือ หรือการจัดการที่ส่งผลต่อผู้ป่วย หรือระบบบริการ/โรงพยาบาล
- ปัญหาภายในที่ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วย และรักษาพยาบาล
- การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน/วิชาชีพ
- ความไม่พึงพอใจของ ญาติ/ผู้ป่วย/แพทย์

### อุบัติการณ์/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงที่ต้องรายงานทันที (Sentinel Events)

#### ในด้านการรักษาพยาบาล (Medical)

- การเสียชีวิตของผู้ป่วยโดยไม่คาดหมาย (ทุกสาเหตุ)
- การเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยจนถึงขั้นทุพพลภาพถาวร (ทุกสาเหตุ)
- การเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ป่วย เช่น
  - หัตถการ/ผ่าตัด ผิดคน/ผิดอวัยวะ/ผิดตำแหน่ง
  - การให้เลือดผิดคน/ผิดหมู่
  - ส่งสารกผิดพ่อ - แม่ / ลักษณะราก / ผู้ป่วย
  - การทำร้ายร่างกาย/ประทุษร้ายในโรงพยาบาล
  - เครื่องมือแพทย์/ผ้าคล้องในร่างกายผู้ป่วย
  - ผู้ป่วย/ญาติ ฆ่าตัวตาย / การฆ่าตัวตาย
  - การให้ยา/สารน้ำผิดแพดต์ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเป็นอันตราย

4. เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่โรงพยาบาล/บุคลากร
5. อุบัติภัยหนัก
6. ความผิดพลาด/ความเสียหายใด ๆ ที่มีโอกาสนำไปสู่การฟ้องร้อง/การเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล

ในระบบบริหาร (Non – Medical)

1. อัคคีภัย/ถูกขู่ว่าจะระเบิด
2. จารกรรมทรัพย์สิน
3. การรั่วไหลของสารเคมี/ชีวภาพ/กัมมันตรังสี/ก๊าซ
4. เหตุการณ์ ฯ ที่เสี่ยงต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคลากร/โรงพยาบาล

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่แน่ใจในการรายงานให้รายงานไว้ก่อน

ระดับความรุนแรง	ตัวอย่าง	ระดับความเสี่ยง
A : เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสที่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน	- เก็บยา High Alert Drug ไว้กับยาทั่วไป	Low Risk
B : เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยแต่ยังไม่ถึงผู้ป่วย	- เขียนชื่อ-สกุล ผู้ป่วยในใบ Lab ผิดคน (ตรวจพบก่อน)	
C : เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยแต่ไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตราย	- ให้ยาผู้ป่วยผิดเวลา	
D : เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้มีการเฝ้าระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย	- ให้ยาผู้ป่วยผิดชนิด ต้องสังเกตอาการแต่ไม่พบผลไม่เพียงประสงค์	Moderate
E : มีผลทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเพิ่มมากขึ้นจากเหตุการณ์นั้น	- ผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุขณะเคลื่อนย้าย มีผลทำให้รีเวณข้อศอก ต้องทำการผ่าตัด	
F : มีผลทำให้ผู้ป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้น	- ผู้ป่วยตกเตียง มีกระดูกสะโพกหัก ต้องทำการผ่าตัด	
G : มีผลทำให้ผู้ป่วยเกิดความพิการ	- หลังให้ยาฉีดเข้าเส้น ผู้ป่วยเกิดภาวะแสบร้อน ปวด และอักเสบ เกิด cyanosis ที่แขนสูดท้ายเกิด gangrene ต้องตัดแขน	High Risk
H : มีผลทำให้ผู้ป่วยต้องปฏิบัติการกู้ชีวิต	- ผู้ป่วยหลังผ่าตัด เข้าห้องน้ำเป็นลม หมดสติต้องทำการกู้ชีวิต	
I : มีผลให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิต	- ผู้ป่วยได้รับยาตัวที่เคยแพ้ มีอาการ Shock และเสียชีวิต	