



# แนวทางปฏิบัติ

## เมื่อสัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วย

ถูกเข็มหรือของมีคม ต่ำ / บาด

เลือดหรือสิ่งคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา / ปาก

ล้างออกด้วยน้ำและสบู่  
ห้ามบีบ แคนบาดแผล

ตา : ล้างด้วยน้ำสะอาด หรือ 0.9% NSS  
ปาก: บ้วนด้วยน้ำสะอาด

**ในเวลาราชการ**  
แจ้งพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ  
โทร 1025

**นอกเวลาราชการ**  
แจ้งแพทย์เวร

ตรวจสอบผลเลือดผู้ป่วย Anti HIV / Anti HCV / HBsAg\*

ไม่ทราบผู้ป่วย

ผู้ป่วยไม่มีผลเลือด  
ภายใน 1 เดือน

ผู้ป่วยที่มีอาการต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ  
ภายใน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา  
- ไข้ และออกผื่น - Aseptic meningitis  
- Facial palsy - Guillain barre syndrome

ส่งเจาะเลือดผู้ป่วย  
- Anti HIV rapid test  
- Anti HCV  
- HBsAg\* กรณีบุคลากรไม่มีภูมิคุ้มกัน  
หรือไม่ทราบผลเลือด

ติดตามผลเลือด  
ภายหลังได้รับ specimen  
- Anti HIV 2 ชั่วโมง  
- Anti HCV/ HBsAg ภายใน 1 วัน

ผลเลือด Anti HIV เป็นบวก  
และ/หรือ HBsAg เป็นบวก

ผลเลือด Anti HCV  
เป็นบวก

ผลเลือดเป็นลบทุกตัว

พบอายุรแพทย์ที่ ER/ OPD  
โดยด่วนที่สุด

เจาะเลือดบุคลากร  
ภายใน 72 ชั่วโมง

ไม่ต้องเจาะเลือด  
บุคลากร

**นอกเวลาราชการ** แจ้งหน่วยควบคุมการติดเชื้อในวันทำการถัดไป เพื่อซักประวัติบันทึกเป็นหลักฐาน ติดตามและดูแลบุคลากร