

คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายขนาน

1. กรณีจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ ดังนี้
 - กรณีมีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือสมาชิกที่มีอาการป่วย/ สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่ควรใกล้ชิดหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา
 - ผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัวทุกคน ต้องล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะหลังออกจากห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง สำหรับสมาชิกคนอื่นต้องล้างมือก่อนและหลังสัมผัสตัวผู้ป่วยด้วย
 - อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้ป่วย ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม แก้วน้ำ แต่สามารถซัก ล้างทำความสะอาดร่วมกันได้ตามปกติ
 - สามารถรับประทานอาหารร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลาง
 - ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจจุกจากระเช้าเพื่อยืนยันว่า มีเชื้ออยู่อีกหรือไม่ เมื่อต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลครั้งต่อไป โดยผู้ป่วยอาจได้รับการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปจนกว่าผลตรวจจุกจากระไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ระยะเวลาเฝ้าระวังประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
2. กรณีส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อโรงพยาบาลอื่น ให้ปฏิบัติดังนี้
 - แพทย์เจ้าของไข้เขียนสรุปการติดเชื้อดื้อยาของผู้ป่วย ไว้ในใบสรุปการรักษา และพิมพ์ให้ไปกับผู้ป่วย
 - แพทย์/ พยาบาลเจ้าของไข้ ประสานงานโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา