



ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง นโยบายการจัดการคู่ยาที่เกิดอันตรกิริยาที่ห้ามสั่งใช้ร่วมกัน

จากประกาศนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนระบบการจัดการด้านยาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 ที่มีเจตจำนงที่จะให้ระบบยาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และยั่งยืน และมีมติคณะกรรมการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 จึงขอประกาศนโยบายการจัดการคู่ยาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้ภาควิชา หน่วยงาน และ บุคลากรผู้ให้บริการ ได้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

รายการคู่ยาที่เกิดอันตรกิริยาที่ห้ามสั่งใช้ร่วมกัน (Fatal Drug Interaction)

ลำดับ	คู่ยา	ผลการเกิดอันตรกิริยา	
1	Protease inhibitors (ได้แก่ atazanavir, darunavir, lopinavir+ritonavir)	Ergot derivatives (ได้แก่ ergotamine (cafergot®), methylergometrine)	Ergotism (ischemia of the extremities)
2	Protease inhibitors (ได้แก่ atazanavir, darunavir, lopinavir+ritonavir)	Sildenafil	Severe hypotension or shock
3	Nitrates (ได้แก่ isosorbide dinitrate, nitroglycerin)	Sildenafil	Severe hypotension or shock
4	Amiodarone	Thioridazine	Cardiac arrhythmias including torsades de pointes
5	Fluoxetine	Thioridazine	Cardiac arrhythmias including torsades de pointes
6	Pimozide	Thioridazine	Cardiac arrhythmias including torsades de pointes

การสั่งใช้ยา

1. การสั่งใช้ยาโดยแพทย์ ต้องดำเนินการบันทึกในระบบ Hospital Information System (HIS)
2. กรณีจำเป็นที่มีผลต่อผลการรักษาของผู้ป่วย แพทย์ต้องการยืนยันการสั่งใช้รายการคู่ยาข้างต้น ให้ขอ อนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหนังสือแสดงเจตนายินยอมด้วยความ สัมครใจในการใช้ยา (Informed consent) จากผู้ป่วย ญาติ หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย

การจ่ายยา

1. การจ่ายยาโดยเภสัชกร และต้องดำเนินการบันทึกในระบบ Hospital Information System (HIS)
2. ก่อนจ่ายยาทุกครั้ง กรณีเภสัชกรทบทวนรายการยา และพบรายการคู่ยาข้างต้น ให้ติดต่อแพทย์เพื่อยืนยันคำสั่งใช้ยาอีกครั้ง หากแพทย์ยืนยันการสั่งใช้รายการคู่ยาข้างต้น ให้จ่ายยาได้เมื่อได้รับหลักฐานลายลักษณ์ อักษร ว่าได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหนังสือแสดงเจตนายินยอมด้วยความ สัมครใจในการใช้ยา (Informed consent) จากผู้ป่วย ญาติ หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย

การบริหารยา

1. การบริหารยาโดยพยาบาล และต้องดำเนินการบันทึกในระบบ Hospital Information System (HIS)
2. ก่อนการบริหารยาทุกครั้ง กรณีพยาบาลทบทวนรายการยา และพบรายการคู่ยาข้างต้น ให้ติดต่อแพทย์เพื่อยืนยันคำสั่งใช้ยาอีกครั้ง หากแพทย์ยืนยันการสั่งใช้รายการคู่ยาข้างต้น ให้บริหารยาได้เมื่อได้รับหลักฐานลายลักษณ์อักษร ว่าได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหนังสือแสดงเจตนายินยอมด้วยความสมัครใจในการใช้ยา (Informed consent) จากผู้ป่วย ญาติ หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย (กรณีเป็นยาที่ไม่อยู่ในบัญชียาโรงพยาบาล หรือยาที่ผู้ป่วยนำติดตัวมา)

ทั้งนี้ขอให้ ภาควิชา หน่วยงาน และบุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธิวิบูลย์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์